



Trastornos sexuales


BACHILLERATO TECNOLÓGICO EN ENFERMERÍA.

LIC. ZAIDA ITZEL TÉLLEZ MARQUEZ

SEXUALIDAD

Puede ser fuente de
placer para el
individuo

Generar malestar o
frustración en el
individuo
(trastornos sexuales)



Sexualidad humana



Respuesta sexual

- Reacción del organismo a la estimulación sexual que implica el desarrollo de cambios diversos a nivel: anatómico, motor y emocional



IDENTIDAD SEXUAL

- **IDENTIDAD DE GENERO:** percepción individual de ser hombre o mujer
- **ROL SEXUAL:** expresión pública de la identidad de género
- **ORIENTACION SEXUAL:** elección del objeto sexual

TRASTORNOS SEXUALES (clasificación DSM V-R)

DISFUNCIONES
SEXUALES

PARAFILIAS

TRASTORNOS DE
LA IDENTIDAD DE
GENERO

DISFUNCIONES SEXUALES

APARECEN CUANDO EXISTEN PROBLEMAS FISIOLÓGICOS O PSICOLÓGICOS QUE DIFICULTAN LA PARTICIPACIÓN O LA SATISFACCIÓN EN LAS ACTIVIDADES SEXUALES
PUEDEN MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS FASES DE LA RESPUESTA SEXUAL



Trastornos del deseo sexual

Incluyen el deseo sexual inhibido o hipoactivo, caracterizado por:

- ▶ Un déficit en las fantasías sexuales
- ▶ Un déficit en el deseo de actividad sexual
- ▶ Trastorno por aversión al sexo

DESEO SEXUAL INHIBIDO (DSI):

caracterizado por la carencia o disminución del apetito sexual y por la no atracción por el sexo

TRASTORNOS DE LA EXCITACIÓN SEXUAL

- ▶ TRASTORNO DE LA EXCITACIÓN SEXUAL EN LA MUJER:

fallo parcial o completo en obtener o mantener la respuesta de excitación sexual hasta la terminación de la actividad sexual

- ▶ TRASTORNO DE LA ERECCION EN EL HOMBRE:

fallo parcial o total en obtener o mantener la erección hasta el final de la actividad sexual

EN AMBOS CASOS, SE PUEDE PRODUCIR EL TRASTORNO DEBIDO A LA FALTA DE SENSACIONES SUBJETIVAS DE EXCITACIÓN SEXUAL

TRASTORNOS DEL ORGASMO

- ▶ **DISFUNCIONES ORGASMICAS (MASCULINAS Y FEMENINAS):**
caracterizada por la dificultad o imposibilidad de alcanzar el orgasmo, tras una fase de excitación normal, durante una actividad sexual que se considera adecuada en cuanto a tipo de estimulación, intensidad y duración
- ▶ **EYACULACION PRECOZ:**
caracterizada por la eyaculación ante una estimulación sexual, antes, durante o inmediatamente después de la penetración y antes de que la persona lo desee

TRASTORNOS POR DOLOR

- ▶ **DISPAREUNIA O DOLOR GENITAL:**

caracterizada por dolor genital (en hombres o mujeres) antes, durante o tras el coito

- ▶ **VAGINISMO:**

caracterizada por la aparición de espasmos en la musculatura del tercio externo de la vagina que interfieren o incluso llegan a impedir el coito

PREVALENCIA

Investigación del Departamento de Psicología del Instituto Nacional de Perinatología (INPer) 2005

La prevalencia de disfunciones sexuales en **mujeres fue de 52%** y en **hombres, de 38.8%**.

En promedio, en el grupo de mujeres con disfunción sexual se presentaron 2.52 disfunciones por paciente y en el grupo de hombres con disfunción sexual, 1.48 por hombre.

Las más frecuentes fueron la **disritmia** en ambos grupos, el **deseo sexual hipoactivo** en el grupo femenino y **la eyaculación precoz** en el grupo masculino.

En las **variables** relacionadas con la vida sexual, **el trauma infantil en mujeres** se asoció con la presencia de disfunciones sexuales, **la práctica masturbatoria en hombres** al grupo sin disfunciones sexuales y **la falta de información sexual** se asoció en ambas poblaciones con el grupo con disfunciones sexuales.

ETIOLOGIA DE LAS DISFUNCIONES SEX.

La etiología de las disfunciones es multifactorial, implicando factores como:

- ▶ Ansiedad
- ▶ Falta de habilidades y conocimientos sobre sexualidad
- ▶ Adopción del rol de espectador

Dentro de los factores psicológicos como la **ANSIEDAD**, interactúan :

- ▶ Factores culturales
- ▶ Factores orgánicos: consumo de fármacos o drogas, y lesiones físicas relacionadas con el desarrollo pleno de la sexualidad

Factores culturales, psicológicos y biológicos

Factores predisponentes

- Educación moral y religiosa restrictiva
- Relaciones deterioradas entre los padres
- Experiencias sexuales traumáticas
- Inseguridad física y con el rol psicosexual

Factores precipitantes

- Parto
- Problemas generales de relación en pareja
- Reacción a algún trastorno orgánico
- Edad
- Depresión
- ansiedad

Factores de mantenimiento

- Ansiedad ante la interacción sexual
- Anticipación al fallo o fracaso
- Sentimiento de culpabilidad
- Falta de atracción entre la pareja
- Deterioro de la autoimagen
- Depresión
- Alcoholismo
- Anorexia
- Estados de ansiedad

PARAFILIAS



EXCITACIÓN DEL SUJETO ANTE OBJETOS Y SITUACIONES QUE NO FORMAN PARTE DE LOS PATRONES SEXUALES NORMATIVOS

Características generales:

- ▶ Intensas y repetidas necesidades, fantasías o conductas sexuales, que generalmente implican objetos anómalos (animales, objetos inanimados, niños)
- ▶ Pueden implicar formas de relación anómalas (sufrimiento o humillación propia o del compañero), se pueden producir relaciones con personas que NO consienten este tipo de actos
- ▶ El sujeto necesita para obtener placer la presencia de determinados estímulos que se apartan de lo que se consideran “estímulos normales”

Parafilias mas comunes (DSM V-R)



SADISMO

- CARACTERIZADO POR LA NECESIDAD DE INFLIGIR DAÑO A OTRA PERSONA PARA EXCITARSE SEXUALMENTE



VOYEURISMO

- SE CARACTERIZA PORQUE LA PRINCIPAL FUENTE DE EXCITACIÓN SEXUAL PARA EL SUJETO ES LA CONTEMPLACION DE PERSONAS DESNUDAS O REALIZANDO ALGUN TIPO DE ACTIVIDAD SEXUAL



EXHIBICIONISMO

- Caracterizado por un alto nivel de excitación sexual a través de la exposición de los genitales de una persona en un lugar publico
- esta conducta se realiza sin que exista un intento de realizar una actividad sexual posterior



FETICHISMO

- se caracteriza porque la principal fuente de excitación sexual del sujeto es la observación o manipulación de objetos inanimados (ropa interior, distintas prendas de vestir, o juguetes)



FETICHISMO TRAVESTISTA

- la conducta fetichista se limita a ponerse ropa del sexo contrario
- estos sujetos suelen tener ropa interior del sexo opuesto que utilizan para travestirse, bien cuando están solos o bien cuando realizan el acto sexual con su pareja



FROTEURISMO

- consiste en la obtención de placer de forma preferentemente o exclusiva, a través del frotamiento de los órganos genitales contra el cuerpo de una persona desconocida y sin el consentimiento de esta



PAIDOFILIA (PEDOFILIA)

- caracterizada por la presencia de fantasías y conductas que implican la actividad sexual de un adulto con un niño



MASOQUISMO

- consiste en la necesidad de ser humillado, atacado, maltratado o dañado para obtener placer sexual

ETIOLOGIA DE LAS PARAFILIAS

SE CONOCE POCO SOBRE LOS FACTORES QUE CAUSAN LAS PARAFILIAS

- ▶ PERSPECTIVA BIOLÓGICA:
no existe evidencia que avale la presencia de un factor biológico específico
- ▶ PERSPECTIVA PSICOLÓGICA:


Los modelos de condicionamiento explican las parafilias en base a la asociación entre determinadas situaciones estimulares con una respuesta de excitación sexual

La importancia de ciertas actitudes y cogniciones hacia el sexo, así como la ausencia de habilidades heterosexuales que faciliten una relación sexual normal

TRASTORNO DE LA IDENTIDAD SEXUAL



SE REFIEREN A LA DISOCIACION ENTRE EL SEXO ANATOMICO Y LA PROPIA IDENTIDAD SEXUAL. (DISFORIA DE GENERO)

- 
- ▶ Los trastornos de identidad de género son trastornos en los que el individuo se identifica, de un modo intenso y persistente, con el otro sexo junto con malestar persistente por el propio sexo anatómico (asignado) o un sentimiento de inadecuación en el papel de su sexo. (**DISFORIA DE GENERO**)
 - ▶ Este trastorno describe un conflicto entre el género físico o manifiesto de una persona y su propia autoidentidad. Por ejemplo, una persona identificada como hombre puede realmente sentir y actuar como si fuera una mujer. **Esto es diferente al homosexualismo, ya que los homosexuales casi siempre se identifican con su sexo o género manifiesto**

SIGNOS Y SÍNTOMAS

niños

Expresan el deseo de pertenecer al sexo opuesto

Tienen disgusto con sus propios genitales

Creer que ellos crecerán y llegarán a ser del sexo opuesto

Son rechazados por su propio grupo y se sienten aislados

Sufren depresión o ansiedad

adolescentes

Deseo de vivir como una persona del sexo opuesto

Desean deshacerse de sus propios genitales

Visten de una manera que es típica del sexo opuesto

Sufren depresión o ansiedad

Se sienten aislados

adultos

Evitan la interacción social

Cambian la forma de vestir y muestran hábitos característicos del sexo opuesto

Etiología del trastorno de identidad sexual

- ▶ Los factores biológicos, como la dotación genética y el medio hormonal prenatal, determinan en gran medida la identidad de género, pero tanto ésta como el papel de género se constituyen de forma estable por influencia de factores sociales, como la cualidad del vínculo emocional con los padres y la relación que cada uno de éstos establece con su hijo