

¿Qué hacer después de un traumatismo?

Después de un traumatismo, se debe seguir una dieta blanda durante 15 días. Los niños deben cepillarse los dientes con un cepillo blando después de las comidas, utilizando clorhexidina tópica 2 veces al día durante una semana.

Los padres deberán verificar e informar al odontólogo de los signos y síntomas como: aparición de fístula, dolor y/o alteración del color

¿Cómo puede ayudarte tu Odontólogo para prevenir un trauma?

El niño deberá utilizar un protector bucal, principalmente en deportes de contacto con un overjet incisal aumentado. El tratamiento ortodóntico debe ser planeado en dentición mixta, corrigiendo alteraciones esqueléticas y del hueso alveolar, principalmente clases III y clases II

Comunícate con nosotros

Yezenia Valentina Pérez
Corona
Cel: 5527532011



Prevención sobre Traumatismo en dientes....



La prevención debe ir enfocada a tres niveles:

1. Identificación y toma de conciencia del problema (educación y prevención).
2. Actividades de diagnóstico-terapéuticas encaminadas a detectar biotipos y actitudes predisponentes a sufrir lesiones traumáticas
3. Diseño de metodología y aparatos para reducir los efectos de las mismas (63).

Si existe un traumatismo dental, es necesario....



Referir al niño a un odontólogo. Si hay una avulsión de un diente temporal no hay que reimplantarlo, debido al riesgo de dañar el germen del diente permanente. Si hay una avulsión dental en un diente definitivo hay que intentar reimplantarlo en su alveolo en los primeros 20 minutos de una forma suave. Este debe encontrarse limpio, sosteniéndolo por la corona, si está un poco sucio se debe lavar con suero o agua. Enseguida hay que acudir al odontólogo para ferulizar y hacer un control.

PADRES, ¿CÓMO PUEDEN PREVENIR QUE SUS HIJOS TENGAN TRAUMATISMOS?

EDADES DE 0- 3 AÑOS

La falta de coordinación le impide protegerse de los golpes contra muebles y objetos. La causa más frecuente es el choque contra las mesas bajas; por lo que es aconsejable que los padres las retiren o coloquen protectores en las esquinas hasta que el niño camine con más seguridad

DE 3 A 6 AÑOS

La utilización de cinturones de seguridad y sillas para coche. En esta fase empieza el gusto por los triciclos, las bicicletas y patines, siendo necesaria la utilización de cascos

DE 6 A 18 AÑOS

En estas edades empiezan la práctica de deportes. Por este motivo, se recomienda la utilización de protectores bucales

